


Fogváltás

A gyerekeknek általában 2 éves korukig előbújik mind a 20 tejfoguk. Ezek apró, kis gyökérrel rendelkező fogacskák. Ahogy fejlődnek, a növekvő koponya és állkapocs nagyobb fogakat kíván. A tejfogak helyét 6 éves korban kezdik el átvenni a nagyobb, erős gyökérrel bíró maradó fogak. A maradó fogak száma 32, azaz 12-vel több, mint a tejfogak. Az általános iskola megkezdésével - 6 éves kor körül - előbújik az első maradó nagyörlő. Ez az utolsó tejfog mögött bújik ki. Mivel nem jár tejfog kieséssel sokszor nem tudatosul, hogy már egy maradó fogról van szó, melyre fokozottan kell vigyázni, hogy egy életen át funkció képes maradjon. 7-8 éves korban kezdenek kipotyogni az alsó-felső kis és nagymetszők, összesen 8 darab. Néha a már lötyögő fog mögött megjelenik az új, növekvő fog éle. Ez normál esetben a tejfog kiesése után a helyére vándorol. Ha a hely túl kevés, a fogak pedig túl nagyok, torlódás alakulhat ki. Ilyenkor fogszabályzó szakorvos segítségét kell kérni. 9 éves korban kezdenek előtörni a kisörlők, összesen 8 fog. 11 évesen a szemfogak, 12 évesen pedig a második nagyörlők jelennek meg, újabb 8 fog. A bölcsességfogak csak 18-20 éves kor körül törnek elő. Ezeknél a fogaknál nagy a variáció. Egyes esetekben nincs csíra, vagy ha van is, a csontban reked és nem tör elő. Gyakran rendellenes helyzetben fekszik, és nem tud kibújni. A félig előtört fog körüli tasakba beszorult étel gyulladást okozhat, ami komoly fájdalommal jár. Ilyenkor szájszűrésen a fog eltávolítása javasolt.



- | | |
|---|---|
| 6 éves kor
4 nagy őrlő (a tejfogak kihullása előtt)
2 alsó metszőfog | 10 éves kor
2 alsó szemfog
4 kis őrlő |
| 7 éves kor
2 felső metszőfog
2 alsó metszőfog | 11 éves kor
2 felső szemfog
4 kis őrlő |
| 8 éves kor
2 felső metszőfog | 12 éves kor
4 nagy őrlő |

A megadott életkorokban lehet változás. A lányok általában korábban, a fiúk kissé lemaradva, később kezdik váltani a fogukat. A fogváltást egyéb tényezők (pl.: alultápláltság, hormonális betegségek...) is befolyásolhatják.

A fogváltás általában gond nélkül lezajlik. Néha a mozgó fog alatti íny begyulladhat, fájdalmas lehet. Az előtörő fog feletti íny lilásan megduzzadhat. Erős fájdalom esetén segíthet a patikákban kapható gél (pl Gengigel Baby). Keményebb ételek rágásával a fogak előtörése gyorsítható.

Normál esetben a kiesett fog helyén azonnal vagy fél-1 éven belül megjelenik a maradó fog csücske. Ha ez nem következik be jelentkezzünk fogorvosnál, mert ennek oka lehet, ha a fog elakad a csontban vagy esetleg nincs fogcsíra (aplasia).

A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.

Email: szanident@gmail.com

Web: www.szanident.atw.hu